PARTE II / LE PRIME 72 ORE

RCP e DAE: adulto incosciente

Riferimento: ERC 2025 per l’adulto. La gestione di bambini e lattanti richiede istruzioni specifiche dell’operatore e formazione.

CONDIZIONE PER INIZIARE

Non risponde + non respira normalmente: chiama subito **112** (vivavoce), fatti guidare e inizia le compressioni. I respiri agonici non sono respirazione normale. Chiedi un **DAE** a un’altra persona, se disponibile.

SEQUENZA OPERATIVA (ADULTO)

1 CHIAMA

112, vivavoce


2 COMPRIMI

Centro del torace

3 DAE

Segui i messaggi

DOVE PREMERE



Schema indicativo, non addestramento pratico.

COMPRESSIONI

100–120/min

Profondità: 5–6 cm

Braccia dritte, rilascio completo del torace, poche interruzioni. Se non sei formato alle ventilazioni, esegui compressioni continue seguendo il 112.

DAE: ASCOLTA E SEGUI LE ISTRUZIONI

Accendi il defibrillatore, applica gli elettrodi come mostrato sul dispositivo. **Nessuno tocchi la persona** durante analisi o scarica. Riprendi le compressioni quando indicato. Non interrompere finché subentrano i soccorsi o la persona riprende a respirare normalmente.